

HOJA TÉCNICA

REGISTRO SANITARIO: RSCO-FUNG-0604-X0420-064-23.6

1. GENERALIDADES

Powmyl® es un fungicida formulado como suspensión concentrada para su aplicación en los cultivos de banano y para controlar las enfermedades de Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*).

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Fungicida / Suspensión Concentrada

% P/P

INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

Dietofencarb
Isopropil 3,4-dietoxicarbanilato
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

23.60%

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, anticongelante, espesantes, antiespumante, conservador y diluyente.

76.40%

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

| | |
|--|---|
| Nombre común (ingrediente activo) Dietofencarb | Categoría toxicológica 5 |
| Grupo químico Carbamato | Fitotoxicidad Este producto no es fitotóxico para los cultivos mencionados, usando las dosis aquí recomendadas. |
| Nombre químico Isopropil 3,4-dietoxicarbanilato. | Efectos adversos No se han encontrado. |
| Formulación Líquida | Compatibilidad Este producto no se recomienda en mezclas en tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. |

HOJA TÉCNICA

4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Powmyl® Manipule el producto con el equipo de protección personal mencionado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta. Antes de abrir, agite vigorosamente la botella del producto, para abrir ejerza presión en la tapa y gire en sentido contrario de las manecillas del reloj. Para medir la dosis de producto utilice una probeta graduada o el equipo más exacto disponible. Agregue agua al contenedor donde preparará la mezcla de aplicación a la mitad de su capacidad y agregue la dosis medida del producto para una aplicación, mezcle suavemente hasta que el producto se suspenda por completo, agregue el agua necesaria para completar la capacidad del contenedor, mezcle y deje reposar durante 15 min. Elija el equipo de aplicación que mejor se adapte a las condiciones de su plantación, se recomienda usar boquilla de cono lleno. Realice la aplicación dirigiendo la aspersion al estrato medio y superior de las plantas procurando lograr una completa cobertura del follaje y evitando escurrimiento excesivo al suelo. Antes de cada aplicación calibre su equipo de aplicación.

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (mL/ha) | OBSERVACIONES |
|---------------|---|---------------|--|
| Banano (0) | Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) | 600 - 800 | Realizar 4 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, al momento de detectar los primeros síntomas de la enfermedad con un promedio ponderado de infección de 0.94; volumen de aplicación sugerido 300 L de agua / ha. |

(0) = INTERVALO DE SEGURIDAD EN DÍAS (Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha)
 TIEMPO DE REENTRADA AL ÁREA TRATADA: 4 horas después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando haya vientos con alta velocidad (mayores a 10 km/hora), horas de calor intenso o inminentes lluvias.

MANEJO DE RESISTENCIA: para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismo de destoxicación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

HOJA TÉCNICA

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Signos y síntomas de intoxicación: Vía dérmica: Se puede presentar irritación en la zona de contacto; vía inhalatoria: Si el producto es inhalado se puede presentar irritación en las vías respiratorias, identificado como flujo nasal y lagrimeo; vía oral: En caso de ingestión se pueden presentar letargo y náuseas. Antídotos y tratamiento específico: No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de AMIFAC a los siguientes teléfonos las 24 horas del día.

En área metropolitana de la Ciudad de México: (55) 5598 6659 y 5611 2634
Desde el interior de la República Mexicana: 01 800 00928 00

Deseche adecuadamente el envase vacío de este producto; realice el triple lavado, perfórelo y envíelo al centro de acopio autorizado más cercano.

Mayor información:
Valent de México S.A. de C.V.
Av. Vallarta 6503 G 8 Col. Cd. Granja
C.P. 45010
Tel: (33) 31 10 01 62
www.valent.mx