

HOJA TÉCNICA

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0367-303-002-075

1. GENERALIDADES

RIZOLEX 75% es un fungicida que actúa por contacto y con acción fumigante, preparado como polvo humectable y enfocado al control de enfermedades del suelo que afectan el cultivo de papa. Un sinónimo de este fungicida es GRACER 75.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	NO MENOS DE	% EN PESO
<i>tolclofos metil:</i> 0-(2,6-dicloro-4-metil-fenil) 0,0-dimetil fosforotioato (Equivalente a 750 g / Kg.)		75.00%
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes y compuestos relacionados	NO MÁS DE	25.00%
	TOTAL	100.00%

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común (ingrediente activo) Tolclofos metil	Categoría toxicológica 4
Grupo químico Organofosforado. Inhibidor de síntesis de fosfolípidos	Fitotoxicidad A las dosis recomendadas no es fitotóxico ni retrasa la germinación de la semilla.
Nombre químico 0-(2,6-dicloro-4-metil-fenil) 0,0-dimetil fosforotioato	Efectos adversos Este producto es tóxico a peces e invertebrados de vida acuática.
Formulación Polvo humectable.	Contraindicaciones La semilla que haya sido tratada no deberá ser utilizada como alimento.
Concentración 750 g / kg	Incompatibilidad No detectada

HOJA TÉCNICA

4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Hacer una premezcla en un recipiente aparte con la cantidad requerida de **RIZOLEX 75%**. El tanque de aspersión llenarlo con agua hasta la mitad, vaciar la premezcla y llenar el tanque con la cantidad de agua necesaria.

RIZOLEX 75% se usa en el cultivo de papa al momento de la siembra ya sea como tratamiento del tubérculo o dirigiendo la aplicación hacia la papa semilla ya depositada en el fondo del surco al momento de la siembra.

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha
	Nombre común	Nombre científico	
PAPA	COSTRA NEGRA	<i>Rhizoctonia solani</i>	5 – 7

* (10 días intervalo a cosecha)

Cuando se está realizando la aplicación directamente a la semilla depositada en el fondo de surco, se debe tratar de cubrirla lo mejor posible durante la aspersión y una vez efectuada a aplicación se debe cerrar el surco y tapar la semilla.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de PROCCYT a los siguientes teléfonos las 24 horas del día:

En área metropolitana de la Ciudad de México: (55) 5598 66 59 y 56 11 26 34
Desde el interior de la República: 01 800 00 928 00

Mayor información:
Valent de México SA de CV
Av. Vallarta 6503 G8 Col. Cd. Granja
Zapopan, Jal. 45010
Tel. (33) 310 10 01 62
www.valent.com.mx